

2016 年麻疹患者情報 n=82、2016 年第 1～35 週（9 月 7 日集計） 1/3

| 診断週 | 性別 | 年齢・年齢群  | 報告都道府県 | 推定感染地域                  | 遺伝子型             | 予防接種歴 |
|-----|----|---------|--------|-------------------------|------------------|-------|
| 35  | 女  | 3 歳     | 埼玉県    | 国内                      |                  | 1 回接種 |
| 35  | 女  | 25～29 歳 | 埼玉県    | 国内                      |                  | 無     |
| 35  | 女  | 35～39 歳 | 千葉県    | 国内                      | H1               | 不明    |
| 35  | 女  | 5～9 歳   | 千葉県    | 国内                      | NT <sup>a)</sup> | 2 回接種 |
| 35  | 女  | 1 歳     | 千葉県    | 国内                      |                  | 無     |
| 35  | 女  | 15～19 歳 | 千葉県    | 国内                      |                  | 2 回接種 |
| 35  | 男  | 40 代    | 東京都    | タイ                      | D8               | 不明    |
| 35  | 男  | 25～29 歳 | 東京都    | 国内                      | H1               | 不明    |
| 35  | 男  | 50 代    | 東京都    | シンガポール<br>または<br>インドネシア | D8               | 不明    |
| 35  | 女  | 25～29 歳 | 東京都    | 国内                      | H1               | 1 回接種 |
| 35  | 女  | 35～39 歳 | 東京都    | 国内                      | D8               | 不明    |
| 35  | 男  | 15～19 歳 | 神奈川県   | 国内                      |                  | 2 回接種 |
| 35  | 女  | 30～34 歳 | 大阪府    | 国内                      |                  | 無     |
| 35  | 女  | 25～29 歳 | 大阪府    | 国内                      | H1               | 無     |
| 35  | 男  | 15～19 歳 | 大阪府    | 国内                      |                  | 不明    |
| 35  | 男  | 30～34 歳 | 大阪府    | 国内                      |                  | 不明    |
| 35  | 女  | 20～24 歳 | 大阪府    | 国内                      |                  | 不明    |
| 35  | 男  | 25～29 歳 | 大阪府    | 国内                      |                  | 不明    |
| 35  | 女  | 25～29 歳 | 大阪府    | 国内                      |                  | 1 回接種 |
| 35  | 女  | 25～29 歳 | 大阪府    | 国内                      |                  | 不明    |
| 35  | 女  | 30～34 歳 | 大阪府    | 国内                      |                  | 不明    |
| 35  | 女  | 30～34 歳 | 大阪府    | 国内                      |                  | 不明    |
| 35  | 女  | 40 代    | 兵庫県    | 国内または<br>中国             |                  | 不明    |
| 35  | 女  | 20～24 歳 | 兵庫県    | 国内                      |                  | 2 回接種 |
| 35  | 男  | 5～9 歳   | 兵庫県    | 国内                      |                  | 1 回接種 |
| 35  | 女  | 15～19 歳 | 兵庫県    | 国内                      | H1               | 無     |
| 34  | 女  | 20～24 歳 | 千葉県    | 国内                      | NT               | 2 回接種 |
| 34  | 男  | 1 歳     | 千葉県    | 国内                      | D8               | 無     |
| 34  | 女  | 5～9 歳   | 千葉県    | 国内                      | D8               | 1 回接種 |
| 34  | 女  | 5～9 歳   | 千葉県    | 国内                      | D8               | 1 回接種 |
| 34  | 女  | 25～29 歳 | 三重県    | 国内                      |                  | 不明    |
| 34  | 男  | 40 代    | 滋賀県    | 国内                      | H1               | 無     |

a) 遺伝子型 NT は Not Typed

掲載内容は疫学調査などの結果により、今後、更新される場合があります。

(国立感染症研究所感染症疫学センター)

2016 年麻しん患者情報 n=82、2016 年第 1～35 週（9 月 7 日集計） 2/3

| 診断週 | 性別 | 年齢・年齢群  | 報告都道府県 | 推定感染地域      | 遺伝子型 | 予防接種歴 |
|-----|----|---------|--------|-------------|------|-------|
| 34  | 男  | 30～34 歳 | 大阪府    | 国内          | H1   | 無     |
| 34  | 女  | 30～34 歳 | 大阪府    | 国内または韓国     |      | 不明    |
| 34  | 女  | 20～24 歳 | 大阪府    | 国内          |      | 1 回接種 |
| 34  | 女  | 20～24 歳 | 大阪府    | 国内          |      | 不明    |
| 34  | 女  | 20～24 歳 | 大阪府    | 国内          |      | 不明    |
| 34  | 女  | 25～29 歳 | 大阪府    | 国内          |      | 1 回接種 |
| 34  | 女  | 20～24 歳 | 大阪府    | 国内          |      | 不明    |
| 34  | 女  | 20～24 歳 | 大阪府    | 国内          |      | 不明    |
| 34  | 女  | 20～24 歳 | 大阪府    | 国内          |      | 2 回接種 |
| 34  | 女  | 30～34 歳 | 大阪府    | 国内          |      | 無     |
| 34  | 女  | 30～34 歳 | 大阪府    | 国内          |      | 2 回接種 |
| 34  | 女  | 20～24 歳 | 大阪府    | 国内          |      | 1 回接種 |
| 34  | 女  | 20～24 歳 | 大阪府    | 国内          |      | 1 回接種 |
| 34  | 女  | 20～24 歳 | 大阪府    | 国内          |      | 2 回接種 |
| 34  | 女  | 20～24 歳 | 大阪府    | 国内          |      | 1 回接種 |
| 34  | 男  | 10～14 歳 | 兵庫県    | 国内          | H1   | 無     |
| 34  | 男  | 15～19 歳 | 兵庫県    | 国内          | H1   | 無     |
| 34  | 女  | 5～9 歳   | 兵庫県    | 国内          | H1   | 無     |
| 33  | 男  | 1 歳     | 千葉県    | 国内          | D8   | 無     |
| 33  | 男  | 5～9 歳   | 千葉県    | 国内          | D8   | 無     |
| 33  | 男  | 0 歳     | 千葉県    | 国内          | D8   | 無     |
| 33  | 男  | 0 歳     | 千葉県    | 国内          | D8   | 無     |
| 33  | 女  | 25～29 歳 | 千葉県    | 国内          | D8   | 不明    |
| 33  | 男  | 15～19 歳 | 千葉県    | 国内          |      | 2 回接種 |
| 33  | 男  | 40 代    | 東京都    | タイ          | D8   | 不明    |
| 33  | 男  | 1 歳     | 神奈川県   | インドネシア      | D8   | 無     |
| 33  | 女  | 20～24 歳 | 愛知県    | 中国          | H1   | 1 回接種 |
| 33  | 男  | 30～34 歳 | 大阪府    | 国内または韓国     | H1   | 無     |
| 33  | 男  | 15～19 歳 | 兵庫県    | 国内またはインドネシア | H1   | 無     |
| 33  | 女  | 20～24 歳 | 和歌山県   | 国内          | H1   | 不明    |
| 33  | 男  | 25～29 歳 | 福岡県    | 国内          | H1   | 不明    |
| 32  | 男  | 1 歳     | 千葉県    | 国内          | D8   | 無     |
| 31  | 男  | 4 歳     | 千葉県    | 国内          | D8   | 無     |

掲載内容は疫学調査などの結果により、今後、更新される場合があります。

（国立感染症研究所感染症疫学センター）

2016 年麻疹患者情報 n=82、2016 年第 1～35 週（9 月 7 日集計） 3/3

| 診断週 | 性別 | 年齢・年齢群  | 報告都道府県 | 推定感染地域                  | 遺伝子型 | 予防接種歴 |
|-----|----|---------|--------|-------------------------|------|-------|
| 30  | 女  | 0 歳     | 埼玉県    | 国内                      |      | 無     |
| 30  | 男  | 0 歳     | 千葉県    | 国内                      | D8   | 無     |
| 30  | 男  | 30～34 歳 | 静岡県    | インドネシア                  | D8   | 不明    |
| 29  | 男  | 30～34 歳 | 北海道    | インドネシア                  | D8   | 無     |
| 29  | 女  | 30～34 歳 | 千葉県    | 国内                      | D8   | 無     |
| 28  | 女  | 40 代    | 東京都    | 国内                      |      | 無     |
| 27  | 男  | 15～19 歳 | 東京都    | 国内                      |      | 2 回接種 |
| 23  | 女  | 60 代    | 埼玉県    | 国内                      |      | 不明    |
| 23  | 男  | 25～29 歳 | 兵庫県    | インドネシア                  | D8   | 1 回接種 |
| 19  | 男  | 0 歳     | 茨城県    | モンゴル                    | H1   | 無     |
| 19  | 男  | 0 歳     | 東京都    | インドネシア                  | D8   | 不明    |
| 19  | 男  | 20～24 歳 | 東京都    | インドネシア<br>または<br>シンガポール | D8   | 不明    |
| 13  | 男  | 30～34 歳 | 東京都    | モンゴル                    | H1   | 無     |
| 11  | 女  | 25～29 歳 | 三重県    | 国内                      | B3   | 不明    |
| 10  | 女  | 30～34 歳 | 埼玉県    | 国内                      | D8   | 不明    |
| 08  | 女  | 30～34 歳 | 群馬県    | カタール                    | D8   | 不明    |
| 02  | 女  | 35～39 歳 | 兵庫県    | 国内                      | D8   | 無     |

掲載内容は疫学調査などの結果により、今後、更新される場合があります。

（国立感染症研究所感染症疫学センター）