

表2. AFM 疑い例を除く AFP 症例と AFM 疑い例の特性比較 (2018年第18週～2019年第49週)

年齢 (歳)	AFM疑い例を除くAFP症例 (n=152)			AFM疑い例 (n=64)		
	全体	2018	2019	全体	2018	2019
中央値	4	4	6.5	3	3	7
四分位範囲	2～10	2～8	2～12.25	2～7	2～5	3～10.5

	AFM 疑い例を除くAFP 症例 n (%)			AFM 疑い例 n (%)		
	合計	2018	2019	合計	2018	2019
性別						
男性	75 (49)	46 (50)	29 (48)	35 (55)	28 (57)	7 (47)
女性	77 (51)	46 (50)	31 (52)	29 (45)	21 (43)	8 (53)
ポリオ含有ワクチン接種歴						
IPV 3 回以上 ^a	91 (60)	65 (71)	26 (43)	43 (67)	35 (71)	8 (53)
IPV 1-2 回	2 (1)	1 (1)	1 (2)	1 (2)	1 (2)	0 (0)
OPV 2 回	36 (24)	20 (22)	16 (27)	6 (9)	4 (8)	2 (13)
OPV 1 回	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
接種歴なし	3 (2)	1 (1)	2 (3)	1 (2)	1 (2)	0 (0)
接種歴不明	20 (13)	5 (5)	15 (25)	13 (20)	8 (16)	5 (33)
推定感染地域						
国内	138 (91)	85 (92)	53 (88)	58 (91)	44 (90)	14 (93)
国外	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (2)	1 (2)	0 (0)
不明	14 (9)	7 (8)	7 (12)	5 (8)	4 (8)	1 (7)
検出された病原体 (重複を含む)						
エンテロウイルスD68	7	7	0	7	7	0
コクサッキーウイルス	9	3	6	4	4	0
エコーウイルス	2	2	0	1	0	1
エンテロウイルス型不明	1	0	1	0	0	0
ライノウイルス	5	2	3	5	3	2
パレコウイルス	7	2	5	0	0	0
アデノウイルス	4	1	3	0	0	0
カンピロバクター	2	0	2	0	0	0
その他	3	1	2	1	1	0
神経症状と神経学的所見						
弛緩性麻痺						
単麻痺						
上肢	23 (15)	16 (17)	7 (12)	9 (14)	9 (18)	0 (0)
下肢	15 (10)	10 (11)	5 (8)	5 (8)	3 (6)	2 (13)
対麻痺						
上肢	14 (9)	11 (12)	3 (5)	9 (14)	7 (14)	2 (13)
下肢	45 (30)	23 (25)	22 (37)	22 (34)	15 (31)	7 (47)
片麻痺	4 (3)	3 (3)	1 (2)	5 (8)	5 (10)	0 (0)
三肢	13 (9)	8 (9)	5 (8)	2 (3)	1 (2)	1 (7)
四肢	31 (20)	17 (18)	14 (23)	11 (17)	8 (16)	3 (20)
顔面	13 (9)	7 (8)	6 (10)	10 (16)	9 (18)	1 (7)
呼吸筋	9 (6)	4 (4)	5 (8)	8 (13)	8 (16)	0 (0)
深部腱反射低下	75 (49)	51 (55)	24 (40)	42 (66)	33 (67)	9 (60)
膀胱直腸障害	20 (13)	10 (11)	10 (17)	17 (27)	11 (22)	6 (40)
意識障害	10 (7)	6 (7)	4 (7)	8 (13)	7 (14)	1 (7)
感覚障害	23 (15)	11 (12)	12 (20)	14 (22)	8 (16)	6 (40)
小脳症状	7 (5)	3 (3)	4 (7)	2 (3)	2 (4)	0 (0)
不随意運動	3 (2)	1 (1)	2 (3)	1 (2)	1 (2)	0 (0)
瞳孔散大	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
その他症状						
発熱	55 (36)	44 (48)	11 (18)	36 (56)	29 (59)	7 (47)
咳・鼻汁	37 (24)	26 (28)	11 (18)	26 (41)	23 (47)	3 (20)
喘鳴	6 (4)	5 (5)	1 (2)	5 (8)	4 (8)	1 (7)
嘔吐	12 (8)	6 (7)	6 (10)	7 (11)	7 (14)	0 (0)
下痢	12 (8)	6 (7)	6 (10)	2 (3)	2 (4)	0 (0)
便秘	15 (10)	10 (11)	5 (8)	6 (9)	5 (10)	1 (7)
検査所見						
蛋白細胞解離	12 (8)	8 (9)	4 (7)	5 (8)	4 (8)	1 (7)

AFP: acute flaccid paralysis/急性弛緩性麻痺; AFM: acute flaccid myelitis/急性弛緩性脊髄炎; IPV: inactivated polio vaccine/不活化ポリオワクチン; OPV: oral polio vaccine/経口生ポリオワクチン

^aIPV 3 回以上: IPV と OPV を組み合わせて接種した例を含む

(感染症発生動向調査: 2019年12月18日現在届出数)